

När bör antibiotikaproylax ges i förhållande till ingreppet

| Antibiotika | Starttid | Starttid | Starttid | | |
|------------------------------------|--|----------------------|----------------------|--------------------|---|
| Generika | Dos 1 | Dos 2 | Dos 3 | Infusionstid (min) | Kommentar |
| Kloxacillin En dos | 30 min före opstart eller BTF | | | 20 | Standarddosering vid ortopedi |
| Kloxacillin Tre dos | 30 min före opstart eller BTF | 2 timmar efter Dos 1 | 4 timmar efter Dos 2 | 20 | Ges vid lång op tid (ortopedi, kärl) samt proteskirurgi |
| Klindamycin En dos | 30-45 min före opstart eller BTF | | | 20 | Vid Pc-Allergi |
| Klindamycin Två dos | 30-45 min före opstart eller BTF | 4 timmar efter Dos 1 | | 20 | Vid Pc-Allergi |
| Klindamycin Tre dos | 30-45 min före opstart eller BTF | 4 timmar efter Dos 1 | 6 timmar efter Dos 2 | 20 | Vid Pc Allergi |
| Trimetoprim-sulfa En dos | 30-60 min före opstart | | | 30 | Bukkirurgi och gynekologi |
| Metronidazol En dos | 30-60 min före opstart | | | 30 | Bukkirurgi och gynekologi |
| Ampicillin En dos | 30 min före opstart | | | 20 | Elektivt sectio |
| Ampicillin En dos (Akut) | Direkt före opstart | | | 5 | Akut sectio |
| Cefotaxim En dos | 30 min före opstart | | | 5 | Vid Sulfa-allergi |
| Cefotaxim Tre dos | 30 min före opstart | 2 timmar efter Dos 1 | 4 timmar efter Dos 2 | 5 | Vid Sulfa-allergi och förlängd profylax |
| Doxycyklin | 30-60 min före opstart | | | 30 | Bukkirurgi |
| Bensylpencillin En dos | 30 min före opstart | | | 5 | Oralkirurgi |
| Vankomycin | 16-60 min från att infusionen startas till op start (1 tim infusion) | | | 60 | Venport och uttalad neutropeni |